

Ürün Kataloğu



Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana[®]
G Ü B R E

www.anagubre.com



ANA GÜBRE

AR-GE ve üretimleri tamamen firmamız tarafından yapılmış olan ürünlerimiz, doğal ve yerel kaynaklar kullanılarak üretilmektedir. Amaç olarak öncelikle ülkemize ve siz değerli üreticilerimize yüksek oranda katkı sağlamaktır. Asıl gayemiz organik ve organomineral gübrelerin Türk tarımına kazandırılmasıdır.

Yıllarca kimyasal gübrelerin yaptığı tahribatların giderilmesi ve geleceğe yönelik temiz toprakların yeni nesillere aktarılabilmesi ancak, organik madde bakımından yoksun Türkiye topraklarının ıslah edilmesi ile sağlanabilir.

Ana gübre olarak sadece bugünü değil geleceği de düşünen tarım anlayışı ile düşük maliyetli ve yüksek standartlardaki ürünlerimiz ile ülke ekonomimize ve siz değerli üreticilerimize hizmet vermektir..

ÜRÜN BAŞLIKLARIMIZ

- Leonardit Menşeli Taban Gübreleri
- Leonardit Menşeli Damla Sulama Gübreleri
- Bitkisel Menşeli Organik Gübreler
- Leonardit Menşeli Toprak Düzenleyici Gübreler
- Leonardit Menşeli Spesifik Gübreler

Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana®
G Ü B R E



Taban Gübreleri

Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana[®]
G Ü B R E

MUHTAR 10-10-10 + S03+ Zn

Organik maddece zengin, makro ve mikro elementleri bünyesinde dengeli bir şekilde bulunduran organomineral toprak altı **Taban Gübresidir** . Leonardit kaynaklı organik ve hümkik asit yapısı sayesinde bitkilerin tohum çıkışına ve iyi kök atmalarına yardımcı olur.

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağı verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyışlı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışı sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI NPK 'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR 10-10-10 + S03+ Zn

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	20
Toplam Azot(N)	10
Amonyum Azotu (N)	4
Üre Azotu (N)	6
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	10
Suda Çözünür PotasyumOksit (K2O}	10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (S03)	5
Toplam (Hümkük+Fulvik)Asit	7
Toplam Çinko (Zn)	0,2
Maksimum Nem	35
Ph	5 - 7

BİTKİLER	KULLANIM ŞEKLİVE ZAMANI!	DOZU
Tüm Sera Sebzeleri	Toprağı Karıştırılarak	50-100 Kg/ Dekar
Açık Tarla Sebzeleri	Toprağı Karıştırılarak	50-70 Kg/ Dekar
Patates	Toprağı Karıştırılarak	80-120 Kg /Dekar
Buğday-Arpa (Tüm Tahıllar)	Toprağı Karıştırılarak	25-40 Kg/ Dekar
Mısır	Toprağı Karıştırılarak	40-60 Kg/ Dekar
Şeker Pancarı	Toprağı Karıştırılarak	70-90 Kg/ Dekar
Pamuk ,Çeltik ,	Toprağı Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Fasülye	Toprağı Karıştırılarak	25-50 Kg/ Dekar
Karpuz-Kavun, Kabak ,	Toprağı Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Soğan-Sarımsak, Havuç-Turp,	Toprağı Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Yer Fıstığı	Toprağı Karıştırılarak	40-50 Kg/ Dekar
Karnabahar-Lahana (Kışlık Bitkiler), Çilek	Toprağı Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Yonca (Yem Bitkileri) , Ayçiçeğı , Yeşilalan-Peyzaj	Toprağı Karıştırılarak	30-50 Kg/ Dekar
Üzüm (Bağ),	Toprağı Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Elma-Armut-Şeftali-Kayısı-Kiraz (Yaşına Göre)	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Ceviz-Badem-Fındık-A.Fıstığı (Yaşına Göre)	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) Narenciye, Limon	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Muz ve Tropikal Bitkiler,	Toprağı Karıştırılarak	50-80 Kg/ Dekar
Çay	Toprağı Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar



10-10-10 + S03+ Zn



MUHTAR 8-22-0+ Zn

Organik maddece zengin, bitkilerin iyi çiçek açımı ve meyve tutumunu sağlayan organomineral toprak altı **Taban Gübresidir** . Leonardit kaynaklı organik ve hümik asit yapısı sayesinde bitkilerin tohum çıkışına ve iyi kök atmalarına yardımcı olur.

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıllı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI NP 'Lİ ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR 8-22-0+ Zn

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	20
Toplam Azot(N)	8
Amonyum Azotu (N)	8
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	22
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	16
Toplam (Hümük+Fulvik) Asit	7
Toplam Çinko (Zn)	0,2
Maximum Nem	35
Ph	5-7



8 - 22 - 0 + Zn

BITKİLER	KULLANIM ŞEKLİVE ZAMAN!	DOZU
Tüm Sera Sebzeleri	Toprağa Karıştırılarak	50-100 Kg/ Dekar
Açık Tarla Sebzeleri	Toprağa Karıştırılarak	50-70 Kg/ Dekar
Patates	Toprağa Karıştırılarak	80-120 Kg /Dekar
Buğday-Arpa (Tüm Tahıllar)	Toprağa Karıştırılarak	25-40 Kg/ Dekar
Mısır	Toprağa Karıştırılarak	40-60 Kg/ Dekar
Şeker Pancarı	Toprağa Karıştırılarak	70-90 Kg/ Dekar
Pamuk ,Çeltik ,	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Fasülye	Toprağa Karıştırılarak	25-50 Kg/ Dekar
Karpuz-Kavun, Kabak ,	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Soğan-Sarımsak, Havuç-Turp,	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Yer Fıstığı	Toprağa Karıştırılarak	40-50 Kg/ Dekar
Karnabahar-Lahana (Kışlık Bitkiler), Çilek	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Yonca (Yem Bitkileri), Ayçiçeği ,Yeşilalan-Peyzaj	Toprağa Karıştırılarak	30-50 Kg/ Dekar
Üzüm (Bağ),	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Elma-Armut-Şeftali-Kayısı-Kiraz (Yaşına Göre)	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Ceviz-Badem-Fındık-A.Fıstığı (Yaşına Göre)	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) Narenciye, Limon	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Muz ve Tropikal Bitkiler,	Toprağa Karıştırılarak	50-80 Kg/ Dekar
Çay	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar



MUHTAR 5-15-5 + 5 SO3+ Mn+Zn+B

Organik maddece zengin, bitkilerin çiçek açımı ve meyve tutumunu sağlayan organomineral toprak altı **Taban Gübresidir** . Leonardit kaynaklı organik ve hümkik asit yapısı sayesinde bitkilerin tohum çıkışına ve iyi kök atmalarına yardımcı olur.

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder.

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyışlı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni,meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışı sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANOMİNERAL GÜBRE
LEONARDİT KAYNAKLI NPK 'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE
MUHTAR 5-15-5 + 5SO3+ Mn+Zn+B

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	20
Toplam Azot(N)	5
Amonyum Azotu (N)	5
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	5
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3)	5
Toplam (Hümkük+Fulvik)Asit	7
Toplam Bor (B)	0,1
Toplam Mangan (Mn)	0,1
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Maksimum Nem	35
Ph	5-7

BİTKİLER	KULLANIM ŞEKLİVE ZAMAN!	DOZU
Tüm Sera Sebzeleri	Toprağa Karıştırılarak	50-100 Kg/ Dekar
Açık Tarla Sebzeleri	Toprağa Karıştırılarak	50-70 Kg/ Dekar
Patates	Toprağa Karıştırılarak	80-120 Kg /Dekar
Buğday-Arpa (Tüm Tahıllar)	Toprağa Karıştırılarak	25-40 Kg/ Dekar
Mısır	Toprağa Karıştırılarak	40-60 Kg/ Dekar
Şeker Pancarı	Toprağa Karıştırılarak	70-90 Kg/ Dekar
Pamuk ,Çeltik ,	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Fasülye	Toprağa Karıştırılarak	25-50 Kg/ Dekar
Karpuz-Kavun, Kabak ,	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Soğan-Sarımsak, Havuç-Turp,	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Yer Fıstığı	Toprağa Karıştırılarak	40-50 Kg/ Dekar
Karnabahar-Lahana (Kışlık Bitkiler), Çilek	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Yonca (Yem Bitkileri), Ayçiçeği ,Yeşilalan-Peyzaj	Toprağa Karıştırılarak	30-50 Kg/ Dekar
Üzüm (Bağ),	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar
Elma-Armut-Şeftali-Kayısı-Kiraz (Yaşına Göre)	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Ceviz-Badem-Fındık-A.Fıstığı (Yaşına Göre)	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) Narenciye, Limon	Ağaç Taç izdüşümüne	1-4 Kg/ Ağaç Başı
Muz ve Tropikal Bitkiler,	Toprağa Karıştırılarak	50-80 Kg/ Dekar
Çay	Toprağa Karıştırılarak	50-60 Kg/ Dekar



5-15-5 + 5SO3+ Mn+Zn+B





Damla Sulama Gübreleri

Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana[®]
G Ü B R E

MUHTAR 9-9-9+TE

Organik maddece zengin, bitkilerin ihtiyacı olan makro ve mikro elementleri yeterli miktarda bünyesinde bulunduran damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **katı organomineral gübredir.**

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarayıslı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni,meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir.**



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI NPK'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR 9-9-9+TE

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot(N)	9
Amonyum Azotu (N)	1.8
Nitrat Azotu(N)	2.6
Üre Azotu (N)	4.6
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	9
Toplam (Hümük+Fulvik)Asit	5
Suda Çözünür Bor (B)	0,02
Toplam Demir (Fe)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,02
Maksimum Nem	35
Ph	5-7



9-9-9+TE

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Kışlık Sebzelerde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler Patates,Şeker Pancarı,- Havuç,Soğan	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda Narenciye,Limon,Portakal,Elma,Armut, Kiraz,Şeftali,Kayısı,Erik,İncir,- Nar, Zeytin,Ceviz,Badem,Fındık,Antep Fıstığı	Ağaç Başına 100-300 mg Omca Başına 50-100 mg	Uç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ; 300 mg / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	-	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Tarla Bitkileri ve Tüm Endüstri Bitkileri Mısır,Ayçiçeği,Pamuk,Fasulye, Yer Fıstığı,Nohut,Mercimek	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Huhubat, Buğday,Arpa,Çeltik, Yonca,Fiğ,- Korunga	-	200 mg / 100 Litre Su



MUHTAR 5-25-5+TE

Organik maddece zengin, bitkilerin özellikle iyi çiçek açımını ve meyve tutumunu sağlayan damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **kıatı organomineral gübredir.**

Bitki gelişimine uygun **ph 3-5** içeriğı ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağılı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağı verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıılı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir.**



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI NPK 'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR 5-25-5+TE

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot(N)	5
Amonyum Azotu (N)	4
Nitrat Azotu (N)	1
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	25
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	25
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	5
Toplam (Hümük+Fulvik)Asit	5
Toplam Bor (B)	0,02
Toplam Demir (Fe)	0,02
Toplam Mangan (Mn)	0,02
Toplam Çinko (Zn)	0,02
Maksimum Nem	35
Ph	3-5



5-25-5+TE

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Kışlık Sebzelerde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler Patates, Şeker Pancarı, - Havuç, Soğan	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda Narenciye, Limon, Portakal, Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Erik, İncir, Nar, Zeytin, Ceviz, Badem, Fındık, Antep Fıstığı	Ağaç Başına 100-300 mg Omca Başına 50-100 mg	Uç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ; 300 mg / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	-	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Endüstri Bitkileri Pamuk, Fasulye, Yer Fıstığı, Nohut, Mercimek	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Huhubat, Buğday, Arpa, Çeltik, Yonca, Fiğ, Körunga, Mısır, Ayçiçeğı,	-	200 mg / 100 Litre Su



MUHTAR 10-5-20+TE

Organik maddece zengin, bitkilerin ilk gelişimini tamamladıktan sonra dengeli bir şekilde büyümelerini sağlayan damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **kati organomineral gübredir.**

Bitki gelişimine uygun **ph 3-5** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyışlı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni,meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışı sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir.**



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI NPK 'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR 10-5-20+TE

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot(N)	10
Amonyum Azotu (N)	1
Nitrat Azotu (N)	7
Üre Azotu (N)	2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	20
Toplam (Hüyük+Fulvik)Asit	5
Toplam Bor (B)	0,02
Toplam Demir (Fe)	0,02
Toplam Mangan (Mn)	0,02
Toplam Çinko (Zn)	0,02
Maksimum Nem	35
Ph	3-5



10-5-20+TE

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Kışlık Sebzelerde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler Patates,Şeker Pancarı,Havuç,Soğan	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda Narenciye,Limon,Portakal,Elma,Armut, Kiraz,Şeftali,Kayısı,Erik,İncir,Nar, Zeytin,Ceviz,Badem,Fındık,Antep Fıstığı	Ağaç Başına 100-300 mg Omca Başına 50-100 mg	Uç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ; 300 mg / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	-	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Endüstri BitkileriPamuk,Fasulye, Yer Fıstığı,Nohut,Mercimek	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Huhubat, Buğday,Arpa,Çeltik, Yonca, Fiğ,Korunga, Mısır,Ayçiçeği,	-	200 mg / 100 Litre Su



MUHTAR 5-5-25+TE

Organik maddece zengin, bitkilerin özellikle meyve büyütme ve iriltme dönemlerinde kullanılan damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **kati organomineral gübredir.**

Bitki gelişimine uygun **ph 4-6** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar.Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir.Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarayıslı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni,meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir.**



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI NPK 'LI ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR 5-5-25+TE

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot (N)	5
Amonyum Azotu (N)	1
Üre Azotu (N)	4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)	5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	25
Toplam (Hümük+Fulvik)Asit	5
Toplam Bor (B)	0,02
Toplam Demir (Fe)	0,02
Toplam Mangan (Mn)	0,02
Toplam Çinko (Zn)	0,02
Maksimum Nem	35
Ph	4-6



5 - 5 - 25+ TE

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Kışlık Sebzelerde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler Patates,Şeker Pancarı,Havuç,Soğan	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda Narenciye,Limon,Portakal,Elma,Armut, Kiraz,Şeftali,Kayısı,Erik,İncir,Nar, Zeytin,Ceviz,Badem,Fındık,Antep Fıstığı	Ağaç Başına 100-300 mg Omca Başına 50-100 mg	Uç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ; 300 mg / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	-	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Endüstri Bitkileri Pamuk,Fasulye, Yer Fıstığı,Nohut,Mercimek	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Huhubat, Buğday,Arpa,Çeltik, Yonca, Fiğ,Korunga, Mısır,Ayçiçeği,	-	200 mg / 100 Litre Su



MUHTAR N15+SO3+TE

Organik maddece zengin, bitkilerin özellikle vejetatif aksamı olan yaprak ve dal gelişimini hızlı bir şekilde sağlayan damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **katı organomineral gübredir.**

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağı verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıllı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışı sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir.**



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI AZOTLU ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR N15+SO3+TE

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot(N)	15
Amonyum Azotu (N)	15
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	2
Suda Çözünür Kükürt Trioksit(SO3)	10
Toplam (Hümük+Fulvik)Asit	5
Maksimum Nem	35
Ph	5-7



N15 + SO3 +TE

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Kışlık Sebzelerde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler Patates,Şeker Pancarı,- Havuç,Soğan	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda Narenciye,Lmon, Portakal, Elma,Armut, Kiraz,Şeftali,Kayısı, Erik, İncir,Nar, Zeytin,Ceviz,Badem,Fındık, Antep Fıstığı	Ağaç Başına 100-300 mg Omca Başına 50-100 mg	Uç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ; 300 mg / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Endüstri Bitkileri Pamuk,Fasülye, Yer Fıstığı, Nohut, Mercimek	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Huhubat, Buğday,Arpa,Çeltik, Yonca,Fiğ,Ko-runga,Mısır, Ayçiçeği	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su





*Leonardit Kaynaklı Toprak
Düzenleyici Gübreler*

Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana®
G Ü B R E

MUHTAR Hümik 15

%15'lik Hümik fulvik ve zengin Organik madde içeriği ile yapraktan ve topraktan tüm bitkilere uygulanabilen süspansiyon halinde **sıvı hümik asittir**.

Bitki gelişimine uygun **ph 4-6** içeriği ile toprakta tutulan bitki besin elementlerini çözerek bitkilerin alabileceği formlara dönüştürür bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Bitki besin elementlerini şelatlar demir klorozunu önler

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antagonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır , bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıslı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT MUHTAR - hümik 15

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	20
Toplam (Hümik + Fulvik) Asit	15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	0,3
Ph	4-6



Hümik - 15

BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3 Litre / Da	300 ml / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3 Litre / Da	200 ml / 100 Litre Su
Tüm Kışık Sebzelerde	2 Litre / Da	200 ml / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3 Litre / Da	300 ml / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler	3 Litre / Da	200 ml / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2 Litre / Da	200 ml / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda	Ağaç Başına 200-300 ml Omca Başına 50-100 ml	Üç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ;300 ml / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	3 Litre / Da	200 ml / 100 Litre Su
Tüm Tarla Bitkileri ve Tüm Endüstri Bitkileri	3 Litre / Da	200 ml / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4 Litre / Da	300 ml / 100 Litre Su



MUHTAR Hümik 50

% 50 'lik Hümik fulvik ve zengin Organik madde içeriği ile tüm bitkiler için toprak altına uygulanabilen **katı leonardirt içerikli toprak düzenleyicisidir** .

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ile toprakta tutulan bitki besin elementlerini çözerek bitkilerin alabileceği formlara dönüştürür, bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Bitki besin elementlerini şelatlar demir klorozunu önler Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Kumlu topraklarda bitki besin elementlerinin yıkanarak kaybolmasını engeller, killi topraklarda ise hümik asitler kil parçacıklarının aralarına girerek besin maddelerinin bu alanlara yerleşmesini sağlar, toprağın iyi havalanmasına yardımcı olur. Koyu siyah rengi toprağın daha iyi ısınması ve tavlı kalmasını sağlar. Toprak yapısını iyileştirir organik maddece zengin tarım topraklarını oluşturur.

Toprağın yapısını düzeltir . Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıllı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler .

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni,meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışı sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimiz-in memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİLER LEONARDİT MUHTAR - hümik 50

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	60
Toplam (Hümik + Fulvik) Asit	50
Max.Nem	35
Ph	5-7



Hümik - 50

BİTKİLER	KULLANIM ŞEKLİVE ZAMAN!	MIKTARI
TÜM MEYVE AGAÇLARI Elma-Armu Şeftali-Kiraz Kayısı-Erik Zeytin-Nar Turunçgiller	KIŞ HAZIRLIĞI SIRASINDA VERİLİR 0-3 YAŞ 4-10 YAŞ 11-20 YAŞ 21 YAŞ VE ÜZERİ	0,5- 1 Kg/ Ağaç 1-1,5 Kg/ Ağaç 2-3 Kg/ Ağaç 5 Kg/ Ağaç
SEBZELER	Dikim öncesi toprağa karıştırılır Bant uygulamasında ürünler şaşırtılmadan önce tavalara karıştırılır Fide yastıklarında ise 5-6 cm derinliğe uygulanır.	100 Kg/ Dekar
SERALAR	Toprak hazırlığında tavsiye edilen miktar toprağa karıştırılır	100-150 Kg /Dekar
TARLA BİTKİLERİ Mısır,Patetes,Pancar, Yonca, Ayçekirdeği	Bant şeklinde uygulama yapılır (ekim öncesi ve sonrası)	70-100 Kg /Dekar
BAĞ ASMA	Omca yaşına ve toprak yapısına göre kış hazırlığı sırasında verilir.	0,5-1 Kg / Ağaç
FİDELER	Harç metaryeline karıştırılır	10 Kg/m3
FİDAN DİKİMİNDE	Fidan dikimi için açılan çukura konularak toprağa karıştırılır	0,5-1 Kg/ Fidan
PEVZAJ-SÜS BİTKİLERİ YEŞİL SAHALARDA	Fide dikiminde yataklara saksılara harç me-taryallerine karıştırılır.	100-150 Kg /Dekar
MUZ VE TROPİKAL BİTKİLER	Fidan dikiminde çukurlara uygulanır Onarım-da fidan çukurlarına uygulanır	150-200 Kg /Dekarr
TÜM ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	Bant şeklinde uygulama yapılır ekim öncesi ve sonrası	70-100 Kg /Dekar





MUHTAR
Organik Gübreler

Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana[®]
G Ü B R E

MUHTAR org/L

Organik maddece zengin içeriği ile yapraktan ve topraktan tüm bitkilere uygulanabilen bitkilerin temel ihtyacını karşılayan **sıvı organik gübredir**. Mikro organizma sayısını arttırarak bitkilerin kök, dal, yaprak ve meyve gelişimini hızlandırır bitkinin gövdesinde aşırı azottan kaynaklanan iç boşalmasını ve azot toksitesini engeller

Bitki gelişimine uygun **ph 4-6** içeriği ile toprakta tutulan bitki besin elementlerini çözerek bitkilerin alabileceği formlara dönüştürür bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. İyi döllenme ve kaliteli meyve oluşumunu sağlar. Bitkiye genel manada koyu yeşil renk kazandırarak yeterli düzeyde fotosentez yapmasını teşvik eder. Bitki daha fazla yeşil kalarak sağlıklı bir şekilde çalışır, Makro ve Mikro besin elementleri ile uyumludur bitkilerin her döneminde kullanılabilir.

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitletmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıllı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışı sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE MUHTAR-org/L

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	30
Organik Karbon	10
Toplam Azot (N)	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	1
Ph	4-6



Org / L

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	SULAMA SUYU İLE KULLANIM MİKTARI	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	3 L / Da	100 litre suya 300 ml
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Çilek) vs.	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	3 L / Da	100 litre suya 200 ml
Tüm Yaprığı Yeneyen Kışık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Lahana, v.s)	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.	2 L / Da	100 litre suya 200 ml
Kavun, Karpuz, Kabak vs.	Dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.	3 L / Da	100 litre suya 300 ml
Fıdanlık, Süs Bitkileri, Tüm Yeşil Alanlar, Çim, vs.	Dikimden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır.	2 L / Da veya ağaç başına 100-150 ml	100 litre suya 150 ml
Tüm Meyve Ağaçlarında Elma, Armut	1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar	5 L / Da	100 litre suya 300 ml
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan v.s)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerrde uygulanır	5 L / Da	100 litre suya 200 ml
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek v.s)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2 tekrerrde uygulanır	2 L / Da	100 litre suya 200-150 ml



MUHTAR org/K

Zengin organik madde içeriği ile tüm bitkiler için toprak altına uygulanabilen bitkilerin temel gereksinimi olan organik madde ve karbon ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilen katı organik **toprak altı gübresidir**.

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ile toprakta tutulan bitki besin elementlerini çözerek bitkilerin alabileceği formlara dönüştürür bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Bitki besin elementlerini şelatlar demir klorozunu önler. Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Kumlu ve killi topraklarda toprak yapısından kaynaklanan sorunları giderir. Bitkilerin besin elementlerinden tam olarak faydalanmasını sağlar. Toprağın yapısını düzeltir. Koyu rengi ile güneş ışınlarının toprağa daha iyi absorbe olmasını sağlar. Toprağın ısınması ve tavlı kalmasında etkili olur.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıllı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MENŞELİ KATI ORGANİK GÜBRE MUHTAR org / K

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Toplam Organik Madde	50
Organik Karbon	20
Toplam Azot(N)	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	1
Maksimum Nem	20
Ph	5-7



Org / K

BİTKİLER	KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI	MİKTARI
TÜM MEYVE AĞAÇLARI		
Elma-Armut	KIŞ HAZIRLIĞI SIRASINDA VERİLİR	
Şeftali-Kiraz	0-3 YAŞ	0,5-1 Kg / Ağaç
Kayısı-Erik	4-10 YAŞ	1-1,5 Kg / Ağaç
Zeytin-Nar	11-20 YAŞ	2-3 Kg / Ağaç
Ceviz- A.Fıstığı-Fındık	21 YAŞ VE ÜZERİ	4-5 Kg / Ağaç
Turuncgiller		
SEBZELER	Dikim öncesi toprağa karıştırılır. Bant uygulamasında ürünler şaşırtılmadan önce tavalara karıştırılır.Fide yastıklarında ise 5-6 cm derinliğe karıştırılır.	100 Kg / Dekar
SERALAR	Toprak hazırlığında tavsiye edilen miktar Toprağa karıştırılır	100-150 Kg / Dekar
TARLA BİTKİLERİ	Bant şeklinde uygulama yapılır (Ekim öncesi ve sonrası)	70 – 100 Kg / Dekar
BAĞ ASMA	Omca yaşına ve toprak yapısına göre kış hazırlığı sırasında ve ilkbahar döneminde verilir.	0,5 – 1 Kg / Ağaç
FİDELER	Harç materyaline karıştırılır	10 Kg / m3
FİDAN DİKİMİNDE	Fidan dikimi için açılan çukara konularak toprağa karıştırılır.	0,5 -1 Kg / Fidan
PEYZAJ – SÜS BİTKİLERİ , YEŞİL SAHALARDA	Fide dikiminde yataklara,saksılara harç materyaline karıştırılır, Yeşil sahalarda bant şeklinde uygulama yapılır ekim öncesi ve sonrası	100 – 150 Kg / Dekar
MUZ VE TROPİKAL BİTKİLER	Fidan dikiminde çukurlara uygulanır.Muz onarımında fidan çukurlarına uygulanır.	150 -200 Kg / Dekar
TÜM ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	Bant şeklinde uygulama yapılır ekim öncesi ve sonrası	70 – 100 Kg / Dekar
ÇAY	Bahçe yaşına göre kış öncesi veya sonrası çay iz düşümüne toprağa gömülerek uygulama yapılır.	70 – 100 Kg / Dekar





MUHTAR
Spesifik Gübreler

Hayatın **ana**'sı topraktır...

ana[®]
G Ü B R E

MUHTAR Kal 9+B

Organik maddece zengin, bitkilerin özellikle **Kalsiyum** ihtiyacını tek başına karşılayabilen, tüm bitkilerde için kullanılabilen damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **amino asit** ihtiva eden özel sıvı halde **organomineral gübredir.**

Kalsiyum bitkilerin hastalıklara karşı direncini sağlayan ve mukavemet kazandıran meyvelerde ise sertlik, parlaklık, dayanıklılık , iyi renk oluşumu gibi meyve kalitesini arttıran önemli bir besin maddesidir.

Bitki gelişimine uygun **ph 4-6** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıllı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir.**



ORGANOMİNERAL GÜBRE AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR Kal 9+B

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot (N)	9
Nitrat Azotu(N)	6
Üre Azotu (N)	3
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	10
Toplam Bor (B)	0,2
Serbest Aminoasitlerin Toplamı	1
Ph	4-6



Kal 9 + B

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	SULAMA SUYU İLE KULLANIM MİKTAR	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	2-3 L / Da	200 – 500 ml 100 litre suya
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	2-3 L / Da	200 -300 ml 100 litre suya
Tüm Yaprığı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvrıkcık, Aysberg v.s)	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır.	2-3 L / Da	200 -300 ml 100 litre suya
Kavun, Karpuz, Kabak vs	Dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır	3-4 L / Da	200 –500 ml 100 litre suya
Fidanlık, Süs Bitkileri vs.	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır	2-3 L / Da veya ağaç başına 200-300 ml	200 -300 ml 100 litre suya
Tüm Meyve Ağaçlarında Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ, Zeytin ve Narenciye v.s	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar	3-5 L / Da	200 -500 ml 100 litre suya
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker Pancarı v.s)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır	3-4 L /Da	200 – 300 ml 100 litre suya
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek v.s)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2 tekrerrüde uygulanır	2-3 L /Da	100-200 ml 100 litre suya



MUHTAR P15+TE

Organik maddece zengin, bitkilerin özellikle stresli ve zor dönemlerindeki **çiçek açımı** ve **meyve tutumunu** sağlayan damlama, yağmurlama ve mini sprink ile uygulanabilen ayrıca yaprak gübresi olarakda kullanılabilen **amino asit** ihtva eden özel **katı organomineral gübredir**.

Bitki gelişimine uygun **ph 3-5** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder .

Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağa verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarayışlı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI FOSFORLU ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR P15+TE

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5)	15
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	15
Toplam (Hümük+Fulvik)Asit	5
Toplam Bor (B)	1
Toplam Mangan (Mn)	2
Toplam Çinko (Zn)	1
Serbest Amino Asitler	1
Toplam Molibden (Mo)	0,01
Maksimum Nem	35
Ph	3-5



BİTKİ ADI	DAMLAMA SULAMA İLE UYG.	YAPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Açık Alan Sebzelerinde	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Kışlık Sebzelerde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek	3-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Tüm Yumrulu Bitkiler Patates,Şeker Pancarı,Havuç,Soğan	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Fidanlık ve Süs Bitkilerinde	2-4 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Bağlarda Narenciye,Limon,Portakal,Elma,Armut, Kiraz,Şeftali,Kayısı,Erik,İncir,Nar, Zeytin,Ceviz,Badem,Fındık,Antep Fıstığı	Ağaç Başına 100-300 mg Omca Başına 50-100 mg	Uç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. Her uygulamada ; 300 mg / 100 Litre Su
Yeşil Alanlar	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Tüm Endüstri Bitkileri Pamuk,Fasülye, Yer Fıstığı, Nohut, Mercimek	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su
Muz ve Tropikal Ağaçlarda	4-5 Kg / Da	300 mg / 100 Litre Su
Huhubat, Buğday,Arpa,Çeltik, Yonca,Fıg,Korunga,Mısır, Ayçiçeği	3-5 Kg / Da	200 mg / 100 Litre Su

P-15 + TE



MUHTAR COMBİ

Organik maddece zengin, bitkilerin özellikle **Mikro element** ihtiyacını karşılayan damlama, yağmurlama mini sprink ile ve yaprak gübresi olarak da uygulanabilen **amino asit** ihtiva eden özel bir **organomineral gübredir**.

Mikro elementler bitkinin gelişimini sağlayan fotosentezi teşvik eden önemli besin maddeleridir. Eksikliklerinde bitki ve meyve gelişiminde gerilemeler hastalıklara karşı zafiyet oluşur. Bitkiler az miktarlarda da olsa mikro elementlere ihtiyaç duyarlar.

Bitki gelişimine uygun **ph 5-7** içeriği ve yüksek çözünürlüğü ile gübrelerin bitki tarafından daha iyi alınımını sağlar. Bu durumda bitkilerin iyi bir vejetatif ve generatif gelişimini teşvik eder. Yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta bıraktığı **tuzlanma, yüksek pH, antogonistik etkilerle toprağın kilitlenmesi, çoraklaşması** gibi kalıcı zararları belirli süre kullanılması sonucunda büyük oranda telafi eder.

Toprağın yapısını düzeltir, toprağı organik madde ve besin elementleri açısından zenginleştirir. Toprağın organik maddesini ve buna bağlı olarak toprakta yaşayan mikro organizma sayı ve faaliyetini artırır bunun sonucu olarak toprağı verilen gübreler bitki bünyesine kolayca geçebilen yarıyıslı formlara dönüşür. Dengeli bir mikro organizma yoğunluğu sağlar bu durumda bitkinin gelişimini, sağlığını, direncini ve verimini olumlu yönde etkiler

Çiftçimizin yüzü güler ürünlerin hem verim, hem de **renk, tat, aroma, albeni, meyve dayanıklılığı, sertliği** gibi kalite sınıflarının da artışını sağlar. Organik ve organomineral gübrelerimiz hem toprağın, hem bitkilerin, hemde elbette çiftçimizin memnuniyetini sağlayan **milli gübrelerdir**.



ORGANOMİNERAL GÜBRE LEONARDİT KAYNAKLI AZOTLU ORGANOMİNERAL GÜBRE MUHTAR COMBİ

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Organik Madde	10
Toplam Azot(N)	10
Üre Azotu (N)	10
Toplam Çinko (Zn)	5
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	3
Toplam Demir (Fe)	1
Toplam Bor (B)	0,5
Toplam Molibden (Mo)	0,01
Toplam (Hümük+Fulvik)Asit	% 5
Serbest Aminoasitlerin Toplamı	1
Maksimum Nem	35
Ph	5-7

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	SULAMA SUYU İLE KULLANIM MİKTARI	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Kavun, Karpuz, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	500-1000 gr/ Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soğan, Havuç, Patates, Çilek) vs.	Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	500-1000 gr/ Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Tüm Yaprığı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvrıcık, Aysberg v.s)	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrürde uygulanır.	500-1000 gr / Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Kavun, Karpuz, Kabak vs.	Dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrürde uygulanır.	500-1000 gr / Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Fidanlık, Süs Bitkileri vs.	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerrürde uygulanır	500-1000 gr/ Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Tüm Meyve Ağaçlarında Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ, Zeytin ve Narenciye v.s	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1.Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde2. Meyve oluşumunda3. Hasat sonuna kadar	500-1000 gr / Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Şeker Pancarı v.s)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerrürde uygulanır	500-1000 gr / Da	100 -300 gr / 100 litre suya
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa, Buğday, Nohut, Mercimek v.s)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2 tekrerrürde uygulanır	500-1000 gr / Da	100 -300 gr / 100 litre suya



Combi

